

РЕЦЕНЗИЯ

на статью :

«КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИКОПИРРОНИЯ БРОМИДА У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ »

1. Шифр специальности:

Статья выполнена по шифру специальности: пульмонология, аллергология, терапия.

2. Класс статьи:

- Наблюдения из практики.
- Практические рекомендации.

3. Научная новизна:

Авторами изучена и показана высокая эффективность и целесообразность назначения пациентам overlap-синдрома препаратов, воздействующих на патогенетические механизмы как ХОБЛ, так и БА, и представляющие собой сочетание ИГКС с комбинированной бронходилатационной терапией.

4. Оценка достоверности представленных результатов:

Проведена клиническая, функциональная оценка эффективности тройной комбинации препаратов на течение overlap-синдрома. Степень одышки по данным mMRC – опросника уменьшилась с 3,00 баллов до 1,50 баллов ($p \leq 0,05$). В группе сравнения значимых различий до наблюдения (3,00 балла) и через 6 месяцев (3,00 балла) не выявлено ($p \geq 0,05$). Средний балл по шкале TDI повысился с 1,50 до 1,97 на фоне терапии ($p \leq 0,05$), что в 3,5 раз выше в сравнении с показателем во второй группе. Это касалось, как функциональных нарушений, так и сложности деятельности, степени усилий. В группе сравнения до наблюдения и через 6 месяцев значимых различий по изучаемым параметрам выявлено не было (табл. 1). На фоне тройной терапии больные с сочетанием ХОБЛ и БА стали проходить большее расстояние и легче переносить физическую нагрузку. Проведена клиническая, функциональная оценка эффективности тройной комбинации препаратов на течение overlap-синдрома. Степень одышки по данным mMRC – опросника уменьшилась с 3,00 баллов до 1,50 баллов ($p \leq 0,05$). В группе сравнения значимых различий до наблюдения (3,00 балла) и через 6 месяцев (3,00 балла) не выявлено ($p \geq 0,05$).

Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6» на персональном компьютере. Данные представлены в виде медианы (Me). Результаты считались статистически значимыми при $p \leq 0,05$. Достоверность

полученных результатов рассчитывалась при доверительной вероятности 95%. Обработка исходных рядов признаков осуществлялась с использованием пакетов прикладных программ Statistica версии 6.0 и EXCEL 2003, SPSS 13.0, MegaStat.

Практическая значимость:

Авторами даны рекомендации по тактике ведения пациентов с данной патологией. Включение гликопиррония бромида в комплексную терапию больных с сочетанным диагнозом ХОБЛ и БА, показало значительную клиническую и функциональную эффективность препарата. Тройная комбинированная терапия (ИГКС, ДДБА, ДДАХП) является оптимальной у пациентов с сочетанием ХОБЛ и БА. Гликопиррония бромид можно рекомендовать в качестве выбора ДДАХП у больных с сочетанием ХОБЛ и БА. Кроме того, однократный прием препарата улучшает приверженность пациентов к лечению. Все вышеизложенное показывает практическую значимость данного исследования.

6. Формальная характеристика статьи

Стиль изложения - хороший, (не) требует правки, сокращения.

К сожалению, нет конкретных выводов к статье, но представлено общий вывод, который позволяет сделать общее мнение по статье.

Использован адекватный современный список литературы.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Статья актуальна, обладает большой практической новизной, рекомендуется для печати.