

РЕЦЕНЗИЯ

на статью «Вопросы адаптации больных язвенной болезнью в условиях Республики Саха (Якутия)»

§ 1. Шифр специальности: Статья выполнена по шифру специальности 14.01.00 – Клиническая медицина.

§ 2. Класс статьи: Оригинальное научное исследование.

§ 3. Научная новизна: Актуальность темы обусловлена широкой распространенностью заболевания. Согласно данным мировой статистики до 10% взрослого населения страдают язвенной болезнью (ЯБ). ЯБ двенадцатиперстной кишки встречается в 4 раза чаще, нежели ЯБ желудка. Доказано, что чаще заболевают лица, работа которых связана с постоянным нервно-психическим напряжением, сочетающаяся с нерегулярным питанием, нарушением режима труда и отдыха. Известно также, что одним из многих факторов в развитии заболевания является расовая принадлежность и регион проживания. Поэтому изучение вопросов адаптации больных ЯБ среди пришлого и коренного населения в условиях Республики Саха (Якутия) представляет особый интерес.

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: В представленной работе не приведен статистический анализ полученных данных. Работа базируется только на констатации в процентном соотношении клинико-эндоскопических характеристик обследуемых пациентов.

§ 5. Практическая значимость: Не представляет сомнений практическая значимость работы. Авторы показали, что процесс адаптации к экстремальным условиям Крайнего Севера протекает неравномерно. У пришлого населения обострения ЯБ отмечались в первые пять лет проживания в Якутии и сохранялись на высоком уровне в течении последующих лет. У коренного населения обострения ЯБ развивались постепенно в течение десяти лет. Независимо от группы через 10 лет проживания на Севере отмечается рост обострения ЯБ, в связи с истощением процессов адаптации. В 31% случаев ЯБ протекает без клинических симптомов, у пришлого населения симптомы диспепсии более выражены, по сравнению с коренными. В старших возрастных группах симптомы болезни становились стертыми. У коренных жителей часто выявляли ЯБ желудка, что, возможно, связано с высокой распространенностью атрофического гастрита и инфекции *H. pylori*. Факторами риска ЯБ являются наследственность, нарушение режима питания, стрессы, инфекция *Helicobacter pylori* и вредные привычки. Полученные данные имеют большое практическое значение.

§ 6. Формальная характеристика статьи: Стиль изложения - хороший, не требует правки и сокращения. Таблицы информативны. Статья имеет высокий процент оригинальности – 83%. Резюме отражает содержание статьи. В статье использован адекватный современный список литературы.

Замечания по статье:

- 1) Для оценки достоверности полученных результатов необходимо включить статистический анализ.
- 2) Выделенные в тексте статьи предложения следует построить грамматически правильно.
- 3) По тексту следует привести расшифровку сокращений ЯБЖ, ДПК, ИБС.
- 4) Работа требует редактирования текста вследствие неправильного построения многих предложений (отсутствие подлежащего и дополнения при указании процентных показателей анализируемых клинико-эндоскопических характеристик обследуемых пациентов).

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Статья может быть опубликована после доработки.

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента